
WIKIPÉDIA

Skorpiovenator

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A ***Skorpiovenator*** (jelentése: "skorpióvadász") az abelisaurida theropoda dinoszauruszok egyik neme, amely Argentínában élt kb. 95 millió évvel ezelőtt, a kréta időszakban. Eddig egyetlen faját, az M. bustingorryit azonosították.

Skorpiovenator 	
Evolúciós időszak: 95 Ma	
kréta-kor	
	
A Skorpiovenator rekonstrukciója	
Természetvédelmi státusz	
Fosszilis	
Rendszertani besorolás	
Ország:	Állatok (Animalia)
Törzs:	Gerinchúrosok (Chordata)
Altörzs:	Gerincesek (Vertebrata)
Altörzság:	Állkapcsosok (Gnathostomata)
Főosztály:	Négylábúak (Tetrapoda)
Osztály:	Hüllők (Reptila)
Főrend:	Dinoszauruszok (Dinosauria)
Rend:	Hüllőmedencéjűek (Saurschia)
Alrend:	Theropoda
Alrendág:	Ceratosauria
Család:	Abelisauridae
Faj:	Skorpiovenator
Típusfaj	
Skorpiovenator bustingorryi	
Canale et al. 2008	
Hivatkozások	
	

Tartalomjegyzék

Felfedezés és elnevezés

A fajt Canale, Scanferla, Agnolin és Novas fedezte fel 2008-ban, Argentínában a Huincul formációban. A *Skorpiovenator* fajnév a görög és latin nyelvből származik, az ásatáson rengeteg skorpiót lehetett látni, ezért kaphatta ezt a nevet. A *bustingorryi* alfajnév a felfedezés helyszínének tulajdonosára, Manuel Bustingorryi farmtulajdonosra utal.

Az egyetlen felfedezett faj, a *Skorpiovenator bustingorryi* egy majdnem teljes csontvázból (MMCH-48 PK) ismert, amiből csak pár farokcsont és egy elülső végtag nagy része hiányzik. A fosszíliára Patagóniában, a Huincul formáció alsó részében találtak rá és feltehetőleg a késő Cenomani korból származik. Olyan ragadozókkal élt együtt, mint a Carcarodontosauridae családba tartozó *Mapusaurus* és az Abelisauridae család egy másik tagja, az *Ilokelesia*. A maradványok Argentínában, az Ernesto Bachmann Paleontological Museum of Villa El Chocónban van elhelyezve.

Anatómia

A kiásott *Skorpiovenator* csontváz teljes hossza 4,35 m. A kifejlett hosszúságot 6 m-re becsülték. 2010-ben Gregory S. Paul a kifejlett példány hosszát 7,5 m-re, tömegét 1,67 tonnára becsülte. A 2016-os becslés 6,2 m, közel áll az eredetihez. Feje rövid volt, akárcsak a többi Abelisauridae családba tartozó

élőlénynek. Felső állkapcsában 19 fog helyezkedett el. Mellső végtagjai rövidek voltak, fogásra képtelenek, de erős lábaival nagy sebességre tehetett szert és segítségeivel kiegyensúlyozta testét.

A Wikimédia Commons tartalmaz ***Skorpiovenator*** témájú kategóriát.

Osztályozás

A *Skorpiovenatort* a Ceratosauria alrendágon belül az Abelisauridae családba, a Carnotaurinae alcsaládba sorolják. Rokonságban állt kortársával, az *Ilokelesiával*. Canale és társai a leírásával együtt egy dél-amerikai elemzést is közzétettek, melyben úgy találták, hogy a család ottani képviselői is a Brachyrostra család tagjai, mint a *Carnotaurus* és az *Aucasaurus*.

Fordítás

- Ez a szócikk részben vagy egészben a *Skorpiovenator* című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Skorpiovenator&oldid=22629269”